

# Gebrauchsanweisung



## Spruzit AF Schädlingfrei

500 ml

- bekämpft Eier, Larven & erwachsene Insekten an Zierpflanzen, Obst & Gemüse
- bekämpft auch Thripse, Zikaden, Spinnmilben, Woll- & Schmierläuse
- nicht bienengefährlich (NB 664 I: nicht bienengefährlich (B4))
- geeignet für den ökologischen Landbau lt. EG-Verordnung

Breit wirksames Spritzmittel zur Bekämpfung von saugenden Insekten wie Blattläusen, Schildläusen sowie Woll- und Schmierläusen, Spinnmilben (Rote Spinne), Thripsen (ausgen. Kalifornische Blütenthripse), Weißen Fliegen und Zikaden an Zierpflanzen, Kernobst und Kohlrabi. Das Mittel wirkt nach eigenen Erfahrungen auch gegen Raupen wie z. B. des Buchsbaumzünslers, Käfer- und Blattwespenlarven.

Die Kombination von Naturpyrethrum und Rapsöl bekämpft die ausgewachsenen Insekten sowie deren Larven und Eier.



<b>Artikelnummer</b>	00457
<b>GTIN Basisartikel</b>	4005240004579
<b>Zulassungsnummer</b>	L 01566-015, 024785-00
<b>Wirkstoff/Deklaration</b>	0,05 g/l (0,005 % w/w) Pyrethrine (Wirkungsmechanismus (IRAC Gruppe): 3A)8,25 g/l (0,83% w/w) Rapsöl (Wirkungsmechanismus (IRAC Gruppe): nicht festgelegt) Enthält ca. 40 g/l 2-Propanol als Lösungsmittel. Kontaktinsektizid, -akarizid, Flüssigkeit zur unverdünnten Anwendung
<b>PSM-/Biozid-Informationen-Satz</b>	Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Verwendung stets Etikett und Produktinformationen lesen. Ggf. Warnhinweise und -symbole in der Gebrauchsanleitung beachten.



<b>Anwendung</b>	<p>Spruzit AF Schädlingfrei ist anwendungsfertig.</p> <p><b>Alle Pflanzenteile mit dem praktischen Überkopf-Sprüher gründlich ober- und unterseits tropfnass benetzen.</b> Pflanzen ab Befallsbeginn bzw. Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen spritzen. Spritzungen in den frühen Morgen- oder späten Abendstunden vornehmen, da die Wirksamkeit bei niedrigen Temperaturen am besten ist. Bei Sonneneinstrahlung können nach der Anwendung Schäden an den Kulturpflanzen auftreten. Abtropfende Spritzbrühe kann Ölflecken auf Fußböden, Gegenständen etc. verursachen, daher Umgebung vor der Spritzung abdecken. Behandelte Flächen/Kulturen erst nach dem Abtrocknen des Spritzbelages wieder betreten.</p> <p><b>Wiederholung der Spritzung:</b></p> <p>Gegen Blattläuse an Kohlrabi und Kernobst: max. 2 Anwendungen im Abstand von 7 Tagen.</p> <p>Gegen Saugende Insekten (Blattläuse, Zikaden, Thripse), Spinnmilben, Raupen, Käfer- und Blattwespenlarven an Zierpflanzen: max. 8 Anwendungen im Abstand von 7 Tagen.</p> <p>Gegen Weiße Fliegen an Zierpflanzen: max. 8 Anwendungen im Abstand von 3 Tagen.</p> <p>Gegen Schildlausarten, Woll- oder Schmierläuse an Zierpflanzen: max. 8 Anwendungen im Abstand von 14 Tagen.</p> <p><b>Wartezeit:</b> 3 Tage (ausg. Frische Kräuter im Gewächshaus: 7 Tage)</p>
<b>Anwendungs-/Zulassungsgebiete</b>	<p>Gegen saugende Insekten an Zierpflanzen im Freiland. Gegen saugende Insekten, Weiße Fliege, Woll- und Schmierläuse, Schildläuse sowie Spinnmilben an Zierpflanzen im Gewächshaus, in Zimmern, Büroräumen und auf Balkonen.</p> <p>Gegen Blattläuse an Kohlrabi und Kernobst im Freiland.</p>
<b>Verwenderkategorie</b>	<p>Anwendung durch nicht-berufliche Anwender zulässig.</p>
<b>Weitere Anwendungshinweise</b>	<p>Aufwandmenge:</p> <p>*Pflanzengröße: bis 50 cm: 60 ml/m<sup>2</sup>*50 bis 125 cm: 90 ml/m<sup>2</sup>*über 125 cm: 120 ml/m<sup>2</sup></p> <p>*Johannisbeerartiges Beerenobst, Brombeere und Himbeere : 100 ml/m<sup>2</sup>*Kernobst: 50 ml je m Kronenhöhe. Süß- oder Sauerkirsche: 35 ml je m Kronenhöhe.</p> <p>Erfolgskontrolle: Abgetötete Schädlinge bleiben zuweilen an den Blättern haften.</p>
<b>Pflanzenverträglichkeit</b>	<p>Spruzit AF Schädlingfrei ist bei bestimmungsgemäßer Anwendung bei hart- und weichlaubigen Pflanzen gut pflanzenverträglich. Vor der Behandlung größerer Bestände empfehlen wir einen Verträglichkeitstest an Einzelpflanzen. An Farnen und Lantanen können vereinzelt Pflanzenschäden auftreten. Keine Anwendung bei Weihnachtssternen. Bei Sonneneinstrahlung können nach der Behandlung Schäden an den Kulturpflanzen auftreten.</p>
<b>Anwenderschutz</b>	<p>Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten. Jeden unnötigen Kontakt mit dem Mittel vermeiden. Missbrauch kann zu Gesundheitsschäden führen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Behandelte Flächen/ Kulturen erst nach dem Abtrocknen des Spritzbelages wieder betreten.</p>



<b>Umweltschutz/ Anwendungsbestimmungen</b>	<p>Das Mittel wird bis zu der höchsten durch die Zulassung festgelegten Aufwandmenge/ Anwendungskonzentration, falls eine Aufwandmenge nicht vorgesehen ist, als nicht bienengefährlich eingestuft (B4). Das Mittel wird als schädigend für Populationen von Bestäuberinsekten eingestuft. Anwendungen des Mittels in der Blüte sollten vermieden werden oder insbesondere zum Schutz von Wildbienen in den Abendstunden erfolgen. Bei der Gewächshausanwendung mit Nützlingseinsatz: Schlupfwespen frühestens eine Woche nach der letzten Anwendung ausbringen. Das Mittel wird als schädigend für Populationen relevanter Nutzinsekten, sowie relevanter Raubmilben und Spinnen, eingestuft. Das Mittel ist giftig für Fische und Fischnährtiere.</p> <p>Von der Zulassungsbehörde festgesetzte Anwendungs bestimmungen: Mittel und dessen Reste, entleerte Behältnisse/Packungen sowie Spülflüssigkeiten nicht in Gewässer gelangen lassen. Dies gilt auch für indirekte Einträge über die Kanalisation, Hof- und Straßenabläufe sowie Regen- und Abwasserkanäle. Die Anwendung des Mittels in oder unmittelbar an oberirdischen Gewässern/Küstengewässern ist nicht zulässig (§ Abs. 2 PflSchG).Unabhängig davon ist der gemäß Länderrecht verbindlich vorgegebenen Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten. Zuwiderhandlungen können mit einem Bußgeld bis zu einer Höhe von 50.000 Euro geahndet werden.</p>
<b>Erste Hilfe</b>	<p>Bei auftretenden Beschwerden ärztlicher Behandlungzuführen. Nach Einatmen: Für Frischluft sorgen. Bei Berührung mit der Hautmit Wasser und Seife abwaschen. Bei Berührung mit den Augen gründlich mit vielWasser spülen und Arzt konsultieren.</p>
<b>Gefahrenhinweise (EUH-Sätze)</b>	<p>EUH401 - Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.</p>
<b>Sicherheitshinweise (P-Sätze)</b>	<p>PI02 - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.</p>
<b>Lagerung</b>	<p>Nur im Originalbehälter aufbewahren. Frostfrei lagern. Nicht bei Temperaturenüber 30 °C aufbewahren.</p>
<b>Entsorgung</b>	<p>Entleerte Verpackungen nicht wiederverwenden.</p>